

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 29-6-73 548748

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE

(ARDENNES, AUBE, HAUTE MARNE, MARNE)

Villa Blanche - 62, Rte Nationale - La Neuville, 51100-REIMS - Tél. 47.22.87 47.13.82

ABONNEMENT ANNUEL 30 F
C.C.P. CHALONS-sur-MARNE 2.800.67 W
Régisseur de Recettes de la Direction
Départementale de l'Agriculture
à Châlons-sur-Marne

Abonnement annuel : 30 F.

SUPPLEMENT N° 2 AU BULLETIN n° 153 de JUIN 1973

n° 16 / 21 juin 1973

V I G N E

Mildiou - Des attaques ont été observées hier, tant sur feuilles que sur grappes, dans diverses parcelles ayant subi des inondations.

Dans ces conditions, et compte-tenu du temps humide que nous subissons il convient de renouveler immédiatement la protection sur l'ensemble du vignoble même si la fleur est en cours. Dans ce cas donner la préférence aux fongicides organiques. Dans les parcelles attaquées on peut envisager un poudrage si un traitement liquide n'est pas réalisable immédiatement.

Oïdium - L'addition d'un soufre mouillable à la bouillie antimildiou est recommandée.

Vers de la grappe - Ceux-ci semblent toujours aussi rares et l'on ne peut envisager qu'un traitement "d'assurance".

G R A N D E C U L T U R E

Tordeuse du pois - Les cultures tardives non intéressées par notre précédent avis, car ne présentant pas encore de gousses au 14 juin, devront recevoir une application insecticide dans les meilleurs délais. Respecter les prescriptions relatives à la protection des abeilles.

Mildiou de la pomme de terre - Les cultures ont dû recevoir pour le 16 juin le traitement préconisé par notre avis du 12 juin. Elles sont donc correctement protégées à l'entrée de la présente période pluvieuse. Toutefois il est rappelé que toute précipitation (ou ensemble de précipitations) supérieure à 20 mm doit être suivie d'une nouvelle protection. D'autre part il est à signaler que les températures anormalement élevées que nous avons eu ces derniers jours sont cependant insuffisantes pour amener une stérilisation des taches.

Puceron noir de la betterave - Il est constaté localement des pullulations du puceron noir. De nombreux prédateurs existant actuellement dans les cultures, les traitements ne doivent être réalisés qu'avec circonspection et avoir un caractère exceptionnel.

Les Ingénieurs chargés des
Avertissements Agricoles,

R. PARIS et A. GODIN

Le Chef de la Circonscription
Phytopathologique CHAMPAGNE,

J. DELATTRE